ステップ名称		共通ステップ							
		基準日			1日後	2日後	3日後	4日後	5日後
		術前	術中	術後					
アウトカム									
手術			手術を行います						
検査	採血検査				検査を受けて頂きます				
	心電図								
	放射線				レントゲンを撮ります				
食事		絶食です。			朝から食事が食べられます。				
薬剤	注射				お昼の12時に点滴が終了します。				
	投薬	朝6時頃、かん腸を行います。			抗凝固剤以外内服再開します	抗凝固剤の内服を再開します			
計画		#1 手術に対する不安がある	#1 手術に対する不安がある	#1 手術に対する不安がある	#1 手術に対する不安がある				
				#2 術後疼痛がある	#2 術後疼痛がある	#2 術後疼痛がある	#2 術後疼痛がある	#2 術後疼痛がある	#2 術後疼痛がある
				#3 手術侵襲による感染の可能性がある（創部・腹	#3 手術侵襲による感染の可能性がある（創	#3 手術侵襲による感染の可能性がある（創	#3 手術侵襲による感染の可能性がある（創	#3 手術侵襲による感染の可能性がある（創	#3 手術侵襲による感染の可能性がある（創
				#4 手術侵襲、術後安静、麻酔の影響による呼吸器 合併症（無気肺、肺炎、肺水腫、肺塞栓な	#4 手術侵襲、術後安静、麻酔の影響による 呼吸器合併症（無気肺、肺炎、肺水	#4 手術侵襲、術後安静、麻酔の影響による 呼吸器合併症（無気肺、肺炎、肺水	#4 手術侵襲、術後安静、麻酔の影響による 呼吸器合併症（無気肺、肺炎、肺水	#4 手術侵襲、術後安静、麻酔の影響による 呼吸器合併症（無気肺、肺炎、肺水	#4 手術侵襲、術後安静、麻酔の影響による 呼吸器合併症（無気肺、肺炎、肺水
測定									
観察									
処置		手術室に行く準備をします。 入室30分前に手術着に着替えます。 合併症予防のためソックスをはいても ら います。 入れ歯や指輪・時計・ヘヤピンなどの 身		手術が終わった後は、症状を観察する た めにお部屋を移動します。 病状観察のために、熱・血圧・脈拍をは かります。 血液の流れを良くするため、足にマッ	手術が終わった後は、症状を観察 するためにお部屋を移動します。 病状観察のために、熱・血圧・脈 拍をはかります。 血液の流れを良くするため、足に マッサージ機を巻きます。 酸素吸入をしていただきます。		術後の傷を診ます		
					午前中に回診を行います。 傷の処置をします。				
活動・清潔				手術後はベッド上で安静にしておいて く ださい。 ベッド上にて安静ですが、看護師が一 緒 にお手伝いして体の向きを変えます。	歯磨きをしましょう。 看護師が体を拭きます。 足の運動を始めましょう（足の曲 げ伸ばし）。 ゆっくり起き上がって歩いてみま しょう。 看護師と一緒にトイレまで歩いて 行ってみましょう。	歩いてトイレに行きましょう。 入浴できます。	歩いてトイレに行きましょう。 入浴できます。	歩いてトイレに行きましょう。 入浴できます。	歩いてトイレに行きましょう。 入浴できます。
教育・指導									
									退院指導
リハビリ依頼		状態に応じリハビリを始めます							